

1.- Informació bàsica

- ✎ Els medicaments poden ser causa d'al·lèrgia quan s'administren a pacients que hi són sensibles. Les reaccions al·lèrgiques als medicaments **més freqüents son de tipus immediat**, com **urticària, asma** i, de manera molt excepcional, **xoc anafilàctic** amb pèrdua de consciència i problemes respiratoris. Amb alguns medicaments **poden igualment produir-se al·lèrgies de tipus més retardat**, que també poden ser greus.

2.- Reaccions foto al·lèrgiques

- ✎ Aquestes són causades per l'**exposició a la llum del sol** quan s'està prenent el medicament. Normalment provoquen l'aparició de taques vermelles a la pell exposada. Aquest és el cas d'alguns medicaments com els antibiòtics, els diürètics, etc., però també de certs perfums i plantes medicinals.

Una vegada instaurada aquesta sensibilitat, la reacció fotoal·lèrgica es produirà sempre que hi hagi exposició al sol i s'estigui prenent determinat medicament, amb **independència de la dosi, de la durada i de la intensitat de l'exposició**.

3.- Al·lèrgies de tipus immediat

- ✎ Les al·lèrgies als medicaments **no són reaccions freqüents**, però sí que representen una part important de les complicacions possibles durant els tractaments. Hi ha al·lèrgies als antibiòtics, a la penicil·lina, als analgèsics, a l'àcid acetilsalicílic i també a medicaments anestèsics, hipotensors, etc.

Totes aquestes **reaccions al·lèrgiques són de tipus immediat**.

4.- Al·lèrgies de tipus retardat

- ✎ Serien reaccions al·lèrgiques retardades, per exemple, les relacionades amb les sulfamides o el cloramfenicol.

El pacient pot igualment desenvolupar una al·lèrgia als excipients (productes que acompanyen la substància activa del medicament per proporcionar-li volum, consistència, color...), per la qual cosa **és important conèixer la composició completa del medicament** en cas de sospitar d'un producte, així com informar sempre de possibles al·lèrgies quan se'ns prescriu un tractament.

5.- Consells

- ✎
 - L'índex d'al·lèrgies a medicaments no és elevat, i els símptomes més freqüents són de caràcter lleu, si bé poden desencadenar-se efectes greus.
 - Si ha presentat en alguna ocasió al·lèrgia a algun medicament, avisi sempre quan li prescriuin un tractament.