

Introducció	<ul style="list-style-type: none">Consisteix en prendre medicaments per la boca; aquests medicaments es poden presentar amb formes diferents:<ul style="list-style-type: none">A. Sòlides: comprimits, càpsules, drogues, etc.B. Líquides: solucions, suspensions, xarops, etc.
Via digestiva	<ul style="list-style-type: none">Poseu-vos dret o assegut.Preneu el medicament sempre acompanyat d'un got ple d'aigua.Empasseu-vos-el sense mastegar, llevat que el metge us indiqui el contrari.
Via sublingual	<ul style="list-style-type: none">Col·loqueu la pastilla sota la llengua.Espereu que es dissolgui sense empassar-vos saliva ni beure aigua.
Precaucions especials	<ul style="list-style-type: none">Tingueu en compte si heu d'ingerir el medicament en els àpats o fora d'aquests.No us els prengueu mai amb altres tipus de beguda (llet, sucs, cervesa, etc.).No manipuleu el medicament (buidar el contingut de la càpsula, triturar o dividir el comprimit, etc.) sense haver-ho consultat prèviament al vostre farmacèutic.
Aplicació oral/Aerosol	<p>Consisteix en la introducció per la boca de medicaments continguts en esprais, en forma de petites partícules o de gotes minúscules, que arriben fins als pulmons.</p> <ul style="list-style-type: none">Munteu l'aerosol seguint les instruccions del fabricant i agiteu-lo.Expulseu tot l'aire dels pulmons.Col·loqueu l'aparell aplicador a la boca i premeu els llavis sobre el broc.Inicieu la inspiració (presa d'aire) per la boca i tot seguit pitgeu l'esprai i continueu la inspiració profundament i intensament (també per la boca).Retingueu la respiració uns instants per aconseguir la màxima penetració i després expulseu l'aire lentament.Espereu un mínim de cinc minuts abans de realitzar una segona administració, si així us ho han prescrit.
Precaucions especials	<ul style="list-style-type: none">Després de l'administració pot ser que tingueu nàusees a causa del mal gust del medicament, això és normal. Renteu bé el broc amb aigua calenta després d'utilitzar-lo.