



Picades d'animals terrestres i aquàtics

Més informació a:
www.farmacauticonline.com

| ANIMAL | LESIÓ | ACTUACIÓ I TRACTAMENT |
|--|---|---|
| Mosques, mosquits i tàvecs | Preferentment ataquen les zones descobertes del cos. Com el seu nom indica (hematòfags), succeïen la sang, injectant a la vegada a la "víctima" una secreció de saliva que és la que provoca la picor. | <ul style="list-style-type: none">De manera preventiva es recomana l'ús de camises de màniga llarga i pantalons llargs a partir de la posta de sol, i aplicar repel·lents o insecticides.Aplicar loció de calamina o una pomada d'hidrocortisona. |
| Abelles, vespes, borinots i formigues | No són freqüents les complicacions, però de vegades poden presentar-se reaccions individuals d'hipersensibilitat i anafilaxi. La picadura d'abella generalment produeix una reacció local, dolor i inflamació. | <ul style="list-style-type: none">En el cas de les abelles, treure el fibló sense fer servir pinces per evitar que s'escampi el verí.Rentar amb aigua l'àrea afectada i desinfectar amb un antisèptic.Aplicar gel o compreses fredes.Si el dolor no remet, es pot prendre un analgèsic i un antihistamínic per alleugerir la picor.Les formigues mosseguen, no piquen. El seu verí és pot combatre amb solucions d'amoníac. |
| Escorpí de terra | L'escorpí injecta verí amb un fibló que té a la punta de la cua. | <ul style="list-style-type: none">Treure el fibló sense fer servir pinces per evitar que s'escampi el verí.Rentar amb aigua l'àrea afectada i desinfectar amb un antisèptic.Aplicar gel o compreses fredes.Si el dolor no remet, es pot prendre un analgèsic i un antihistamínic per alleugerir la picor. |
| Aranyes | La seva picada pot produir dolor, eritema o equimosi. | <ul style="list-style-type: none">Desinfectar la ferida.Aplicar una pomada antipruriginosa. |
| Paparras | Les paparras o llagostes es fixen a la pell per xuclar la sang. Si et pica una paparra cal anar amb compte perquè pot produir nombroses malalties. Abunden als boscos, plantes grans i pastures altes. El risc de picada augmenta a la primavera i l'estiu. | <ul style="list-style-type: none">Prèviament, es pot prevenir la picada utilitzant camises de màniga llarga i pantalons llargs.Cal humitejar la pell amb alcohol o benzina per facilitar que la paparra es desenganxi de la pell. Si s'ha d'extreure, cal fer-ho en direcció cap amunt i perpendicularment a la pell.Rentar amb aigua i sabó i desinfectar amb alcohol. |
| Meduses | Són animals invertebrats i molt transparents, cosa que els facilita el camuflatge. Si es toca pot produir una intensa picor i dermatitis. Les restes de tentacles poden ser actius i, per tant, urticants si se'ls toca. | <ul style="list-style-type: none">Rentar la ferida amb aigua salada sense tocar l'àrea afectada.Eliminar qualsevol tentacle que hagi quedat enganxat amb una tovallola humida, mai tocar-lo.Si fa mal, es pot prendre un analgèsic. Si la picada és severa cal adreçar-se a un centre mèdic. |
| Eriçons | Els eriçons poden punxar, més que picar. Les pues són calcàries i s'han de treure de seguida. | <ul style="list-style-type: none">Treure de seguida les pues.Rentar la zona i aplicar un antisèptic.Si les pues, de naturalesa calcària, queden incrustades, es pot provar d'estovar-les amb vinagre perquè es dissolguin. |
| Escorpins de mar | Estan mig enterrats sota la sorra, claven les pues de l'aleta dorsal als peus dels banyistes i fan molt mal. | <ul style="list-style-type: none">Treure les pues amb unes pinces.Rentar-ho amb aigua salada.Cal submergir de seguida el peu, o la part afectada, en aigua calenta.Si fa mal es pot prendre un analgèsic. |

