

1.- Información básica

- ✎ Los medicamentos pueden ser causa de alergia cuando se administran a pacientes sensibles. Las reacciones alérgicas a los medicamentos **más frecuentes son de tipo inmediato**, como **urticaria, asma** y, de forma muy excepcional, **choque anafiláctico** con pérdida de consciencia y problemas respiratorios. Con algunos medicamentos **pueden igualmente producirse alergias de tipo más retardado**, que también pueden ser graves.

2.- Reacciones fotoalérgicas

- ✎ Son causadas por la **exposición a la luz del sol** cuando se está tomando el medicamento. Normalmente provocan la aparición de manchas rojas en la piel expuesta. Éste es el caso de algunos medicamentos como antibióticos, diuréticos, etc., pero también de ciertos perfumes y plantas medicinales.

La exposición al sol no causa ninguna manifestación hasta que no se ha desarrollado la sensibilización o alergia. Una vez instaurada esta sensibilidad, la reacción fotoalérgica se producirá siempre que haya exposición al sol y se esté tomando determinado medicamento, **independientemente de la dosis y de la duración e intensidad de la exposición.**

3.- Alergias de tipo inmediato

- ✎ Las alergias a los medicamentos **no son reacciones frecuentes**, pero sí que vienen a representar una parte importante de las complicaciones posibles durante los tratamientos.

Hay alergias a los antibióticos, a la penicilina, a los analgésicos, al ácido acetilsalicílico y también a medicamentos anestésicos, hipotensores, etc.

Todas **estas reacciones alérgicas comentadas son de tipo inmediato.**

4.- Alergias de tipo retardado

- ✎ Serían reacciones alérgicas retardadas, por ejemplo, las relacionadas con las sulfamidas o el cloranfenicol.

El paciente puede igualmente desarrollar una alergia a los excipientes (productos que acompañan a la sustancia activa del medicamento para proporcionarle volumen, consistencia, color...), por lo que es importante conocer la composición completa del medicamento en caso de sospechar de un producto, así como **informar siempre de posibles alergias** cuando se nos prescriba un tratamiento.

5.- Consejos

- ✎
 - El índice de alergias a medicamentos no es elevado, y los síntomas más frecuentes son de carácter leve, si bien pueden desencadenarse efectos graves.
 - Si ha presentado en alguna ocasión alergia a algún medicamento, avise siempre cuando le prescriban un tratamiento.